

IMSS REFUERZA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER

26 De agosto De 2026

La Vacunación Contra El VPH Y El Papanicolaou Son Las Principales Herramientas Para Prevenir Y detectar A Tiempo Esta Enfermedad.

El Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) Reforzó Sus Acciones De Prevención, Detección Temprana Y atención Integral Del Cáncer Cervicouterino, Con El Objetivo De Identificar Lesiones Precursoras Antes De Que evolucionen A Etapas Avanzadas. La Información Forma Parte Del Comunicado No. 453/2026 Del IMSS, Publicado El 25 De agosto De 2026 Y disponible En La Sala De Prensa Del Instituto. Al Corte Del 26 De agosto, Es El Comunicado Más Reciente localizado En El Archivo Oficial Del IMSS. Prevención Y Detección Temprana el IMSS Señala Que El Cáncer Cervicouterino Representa La Segunda Causa De Muerte Por Cáncer En Mujeres en México. Ante Este Panorama, Los Especialistas Del Instituto Destacan La Importancia De Combinar vacunación, Detección Periódica Y Seguimiento Médico.

La Doctora Lissette Olmos Mejía, Médica Ginecóloga Colposcopia De La UMAE Hospital De Ginecoobstetricia No. 4 "Luis Castelazo Ayala", Explicó Que La Infección Persistente Por El Virus Del Papiloma humano (VPH) Es El Principal Factor De Riesgo Para Desarrollar Este Cáncer. Por Ello, Llamó A Las Mujeres Acudir Periódicamente A Su Unidad De Medicina Familiar Para Realizarse Los Estudios Correspondientes. El Papanicolaou O Citología Cervicovaginal Es Descrito Por El Instituto Como Una Prueba Rápida, Sencilla Y eficaz Que Permite Identificar Lesiones Precursoras Antes De Que Se Conviertan En Cáncer. El Comunicado señala Que Se recomienda Principalmente En Mujeres De 25 A 65 Años, Además De Otros Grupos Cuando existe Indicación Médica. La Vacunación Contra El VPH Constituye Otra Herramienta Fundamental.

El IMSS Explica Que Protege Antes de La Exposición Al Virus Y Reduce Significativamente El Riesgo De Desarrollar Cáncer Cervicouterino.

Factores Que Pueden Incrementar El Riesgo además De La Infección Persistente Por VPH, Los Especialistas Mencionan Factores Asociados Con Un Mayor riesgo, Entre Ellos El Tabaquismo, Las Infecciones De Transmisión Sexual, Múltiples Parejas Sexuales Y alteraciones De La Flora Vaginal.

IMSS: DETECTAR A TIEMPO PUEDE CAMBIAR El pronóstico atención Oportuna Y Tratamientos Menos Agresivos el Doctor Omar Enrique Quintero Rodríguez, Jefe Del Servicio De Tumores Ginecológicos Del Hospital De gineco Obstetricia No. 4, Destacó Que Un Diagnóstico De Cáncer Cervicouterino No Representa

necesariamente Una Sentencia De Muerte, Debido A Los Avances Terapéuticos Que Han Permitido Mejorar La supervivencia Y La Calidad De Vida De Las Pacientes.

De Acuerdo Con El Especialista, Detectar La Enfermedad Oportunamente Permite Obtener Mejores Resultados clínicos Y Utilizar Tratamientos Menos Invasivos, Incluso Mediante Procedimientos Ambulatorios En determinados Casos. Cuando La Enfermedad Se Encuentra En Etapas Más Avanzadas, El Tratamiento Puede Requerir Alternativas como Cirugía, Radioterapia, Braquiterapia Y Quimioterapia, Dentro De Un Modelo De Atención multidisciplinario. El Mensaje Principal Del IMSS Es Que La Prevención No Debe Esperar A Que Aparezcan Síntomas. La detección Periódica Permite Encontrar Alteraciones Antes De Que Evolucionen, Lo Que Abre La Posibilidad De intervenir De Manera Temprana Y Evitar Tratamientos Más Complejos. Un Llamado A La Derechohabiencia Seguro Social Exhorta A Las Mujeres A Utilizar Los Servicios Preventivos Disponibles En Sus Unidades De medicina Familiar Y A Seguir Las Indicaciones Del Personal De Salud. La Vacunación Contra El VPH Y Los estudios De Detección Forman Parte De Una Estrategia Integral Para Reducir La Incidencia Y Mortalidad Por esta Enfermedad. La Prevención También Implica Conocer Los Factores De Riesgo Y Mantener Comunicación Con Los profesionales De La Salud. Ante Cualquier Resultado Anormal, El Seguimiento Médico Es Fundamental Para establecer Un Diagnóstico Preciso Y, Cuando Sea Necesario, Iniciar Oportunamente El Tratamiento